

SU PROCEDIMIENTO PRÓXIMO SERÁ:

registro a las _____

Con

Dr. Evans

Dr. Srinivasan

Dr. Tiwari

Llame al 541-222-6200 si tiene alguna pregunta.

Gracias por programar su colonoscopia. Una colonoscopia es un examen que se usa para buscar cambios, como inflamación o irritación de tejidos, pólipos o cáncer, en el intestino grueso (colon) y en el recto. En una colonoscopia, se inserta un tubo largo y flexible (colonoscopio) en el recto. Con una pequeña videocámara en la punta del tubo, el médico puede ver el interior de todo el colon. Si es necesario, se pueden extirpar pólipos, otros tipos de tejido anormal o biopsias con el colonoscopio en la colonoscopia. También se pueden tomar muestras de tejido (biopsias).

En PeaceHealth, estamos comprometidos con la prevención de enfermedades y con su salud. El cáncer de colon es la causa principal de muerte por cáncer en EE. UU. PeaceHealth, y los expertos nacionales en prevención y salud, recomiendan exámenes de detección de cáncer colorrectal en adultos desde los 45 años y hasta al menos los 75 años (puede ser más para algunos pacientes de alto riesgo). Nuestro departamento agradece la oportunidad de participar en su atención médica.

Gracias por elegir PeaceHealth para sus necesidades de atención médica recientes. Nuestra misión es fomentar la salud personal y la de la comunidad con excelente atención. No dude en llamar a nuestro consultorio si tiene preguntas.

Índice

Para su información.....	página 2
Instrucciones para su colonoscopia.....	página 3-5
Medicamentos especiales.....	página 6
Suprep.....	página 7
TriLyte.....	página 8
SuTab.....	página 9
Preguntas frecuentes.....	página 10
Indicaciones.....	página 11

CANCELACIÓN/REPROGRAMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Si necesita cancelar o reprogramar su cita, llame al 541.222.6200 con **un mínimo de 1 semana de antelación, para que podamos programar a otro paciente.**

TRANSPORTE

Usted debe arreglar para que un familiar o amigo adulto lo lleve al procedimiento y a su casa después del procedimiento. Deberán estar disponibles durante toda la cita. Es política de PeaceHealth que un adulto responsable lo lleve a casa después del procedimiento (viajar en autobús o taxi no es una opción a menos que lo acompañe un adulto responsable). **Si no tiene a nadie con quien ir y volver de la colonoscopia, deberá reprogramarse el procedimiento.**

SEDACIÓN

El sedante lo ayuda a que se relaje y se sienta cómodo durante el procedimiento. Es posible que se sienta bien después de su procedimiento, pero su juicio se verá afectado por el sedante que reciba. ***No conduzca, tome decisiones legales, regrese al trabajo, ni beba alcohol por el resto del día.**

MEDICAMENTOS ACTUALES

Puede tomar todos los medicamentos diarios hasta 2 horas antes de la hora de registro. Los medicamentos incluyen los de la presión y los betabloqueadores, a menos que se indique otra cosa.

ESTREÑIMIENTO

Vea la pág. 6

MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES

Vea la pág. 6 “Instrucciones para medicamentos especiales”

PACIENTES DIABÉTICOS

Vea la pág. 6 “Instrucciones para medicamentos especiales”.

RECOGIDA DE LA PREPARACIÓN CON RECETA

Siga las instrucciones de este paquete y no las que le den cuando recoja la receta. Un miembro de nuestro personal lo llamará aproximadamente una semana antes de la fecha del procedimiento para confirmar la hora, su preferencia de farmacia para el envío de la receta para la preparación del colon, y para responder cualquier pregunta que pueda tener. **Nuestro consultorio DEBE comunicarse con usted para confirmar, de lo contrario el procedimiento se cancelará. Si nuestro personal no lo llama una semana antes de su procedimiento o si tiene preguntas, llame al 541-222-6200.** Si prefiere una preparación para los intestinos más que otra, dígaselo a nuestro personal cuando lo llamen para confirmar el procedimiento. Comuníquese con su seguro sobre la cobertura de las distintas preparaciones, si es necesario.

INSTRUCCIONES PARA LA COLONOSCOPIA

Todas las preparaciones para los intestinos funcionan mejor si se toman como dosis dividida. Tomará la primera dosis la noche antes de la colonoscopia. La segunda dosis la tomará el día del procedimiento. Su preparación para la colonoscopia es crucial para el éxito del procedimiento. Es muy importante que beba toda la solución para limpiar el colon.

SIETE DÍAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA

Si le recetan un medicamento GLP-1 como el que se indica en la tabla de la derecha, deberá dejar de tomarlo 7 días antes del procedimiento.

Name	Brand
Exenatide	Byetta
	Bydureon
Liraglutide	Victoza
albiglutide	Tanzeum
Dulaglutide	Trulicity
Lixisenatide	Lixumia
Beinaglutide	
Semaglutide	Ozempic
	Rybelsus
PEG-loxenate	Fu Laimei
Tirzepatide	Mounjaro

CINCO DÍAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA:

- Evite nueces, semillas, frijoles, maíz, fruta deshidratada, vegetales crudos, ensaladas, palomitas de maíz y panes multigrano.
- Deje de tomar aceite de pescado/suplementos de omega 3 y suplementos de hierro por vía oral.
- Dieta baja en fibras/residuos (consulte las preguntas frecuentes de la última página)

DOS DÍAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA:

- Mantenga todos los AINE Ibuprofeno (Advil), Naprosyn (Aleve) Meloxicam y Aspirina de concentración completa.

EL DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA:

- **Solo líquidos claros hoy. No se permite ninguna comida sólida, productos de leche ni alcohol.**

Los líquidos claros que puede beber incluyen (nada rojo ni morado):

Gatorade	Crystal Light	Jugos de frutas claras
Bebidas carbonatadas	Paletas de hielo	(manzana o uva verde)
Café negro (puede ser con azúcar)	Té negro (puede ser con azúcar)	Gelatinas
Té	Caldo sin grasa (solo hasta medianoche)	Agua con vitaminas

- **5:00 P. M.:** Empiece a beber la primera dosis de la preparación que le recetaron.

Siga las instrucciones de este paquete y no las que le den cuando recoja la receta. Es muy importante no comer comida el día anterior. SOLAMENTE LIQUIDOS

EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA

- **5 horas antes** del registro, beba el resto de la preparación (un vaso de 8 onzas cada 15 minutos) hasta terminarla. Termine de beber toda la preparación 2 horas antes de la hora de registro.
- Siga bebiendo líquidos claros (excepto caldo) hasta 2 horas antes de registrarse.
- **2 horas antes** de registrarse, **no consuma nada por boca (ni siquiera agua) hasta después del procedimiento.**
- Vístete con ropa cómoda que se pueda quitar y poner fácilmente.
- Traiga o use calcetines.

CONSEJOS PARA TOLERAR LA PREPARACIÓN

- Use vaselina/pomada A&D o toallitas de bebé para las molestias en el ano.
- Después de mezclar la solución de preparación, déjela enfriar en el refrigerador unas horas antes de beberla (bébala en un plazo de 24 horas desde que la mezcló).
- Para disminuir el mal gusto en la boca, intente beberla rápidamente. Entre sorbos, puede usar trozos de lima limón o dulces o pastillas de menta o mentol por boca.
- Si empieza a tener hinchazón o náuseas, ralentice el consumo de líquidos, pruebe salir a caminar y tome aire fresco. Debería ir sintiéndose mejor a medida que las deposiciones se hacen más frecuentes.
- Beba con pajilla.
- Las toallitas de limpieza de higiene personal pueden ser más suaves que el papel higiénico.
- Cepíllese los dientes o use enjuague bucal para humedecer la boca.

¿Qué es un “líquido claro”?

Mientras se prepara para la colonoscopia, solo debe beber líquidos claros. Un líquido se considera claro si puede leer algo a través de él. Use esta prueba fácil para saber lo que puede beber y lo que no.



Esto es jugo de naranja. El jugo de naranja no es claro porque no puede leer el periódico a través de él.
No puede beberlo.



Esto es jugo de piña. Tampoco es claro. No puede beberlo.



Esto es jugo de manzana. El jugo de manzana es claro porque puede leer el periódico a través de él.
Puede beberlo.

¿Qué bebidas están permitidas?



OK

Soda, Ginger Ale, agua con gas



OK

Agua y agua mineral




OK

Café negro (sin crema ni leche)




OK

Bebidas deportivas CLARAS con electrolitos



OK

Jugo de manzana



OK

Té

Información del Departamento de Medicina, VA Greater Los Angeles Healthcare System, Los Angeles, California 90073, USA. bspiegel@mednet.ucla.edu

¿ESTÁ FUNCIONANDO SU PREPARACIÓN?

Por qué es importante estar limpio por dentro?

Su médico **debe** poder ver bien para hacer correctamente el examen. Si el interior está sucio, es posible que el médico no vea cosas importantes, como pólipos o un cáncer, o que tenga que repetir el examen. Eso significaría que usted tendría que empezar todo de nuevo, y nadie quiere eso. Ayúdenos a ayudarlo a hacer esto una sola vez.

Imagine esto

Piénselo de este modo: un colon limpio es como conducir en una carretera rural en un día soleado. Un colon sucio es como conducir en una tormenta de nieve.

Quando el colon está limpio, hacer la colonoscopia es como conducir en una carretera rural en un día soleado. Es fácil ver y conducir.




Quando el colon está sucio, hacer la colonoscopia es como conducir en una carretera rural durante una tormenta de nieve. Es difícil ver y conducir.




¿Está funcionando mi preparación?

¿Cómo sé cuándo terminé mi preparación para los intestinos?

Sus heces deben ser similares a lo que está comiendo y bebiendo: claras, **sin muchas partículas**. Sabrá que ha terminado cuando las heces sean **amarillas, ligeras, líquidas y claras...** como la orina. Abajo hay una guía que lo ayudará.



Oscuro y turbio.
NO ESTÁ BIEN

Marrón y turbio.
NO ESTÁ BIEN

Naranja oscuro y algo claro.
NO ESTÁ BIEN

Naranja claro ya casi claras.
¡YA CASI!

Amarillo ya claras, como la orina.
¡ESTÁ LISTO!

Información del Departamento de Medicina, VA Greater Los Angeles Healthcare System, Los Angeles, California 90073, USA. bspiegel@mednet.ucla.edu

INSTRUCCIONES PARA MEDICAMENTOS ESPECIALES

PACIENTES CON ESTREÑIMIENTO

Si tiene estreñimiento, hace deposiciones duras o ha estado tomando analgésicos para el dolor, dígaselo al personal cuando lo llamen para confirmar la hora de su cita.

Para aumentar el éxito de la preparación, deberá tomar otros medicamentos.
(Disponibles sin receta en la farmacia, se deben comprar con antelación)

5 DÍAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA:

- Tome 17 gramos de MiraLAX dos veces al día o como le indique el personal.

1 DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA

- Tome la preparación para los intestinos como le indicaron.
- Si no tiene deposiciones en un plazo de 2 horas desde que empezó con la preparación, tome 20 mg (4 pastillas) de Dulcolax/Bisacodyl.

****Si tiene estreñimiento crónico, podría resultarle útil tomar líquidos claros por 2 días.****

INSTRUCCIONES PARA PACIENTES DIABÉTICOS

	1 día antes de la colonoscopia	Fecha de la colonoscopia
	Hágase la prueba de azúcar en la sangre 3 a 4 veces al día antes del procedimiento.	Hágase la prueba del azúcar en la sangre en la mañana del procedimiento.
Llame al consultorio si su nivel de azúcar en la sangre es superior a 300 o inferior a 100.		
Medicamentos por vía oral	No los tome.	No los tome antes del procedimiento. Vuelva a tomarlos después de haber empezado a comer nuevamente.
Inyectables sin insulina	Solo aplíquese si le corresponde una dosis ese día.	Aplíquese después del procedimiento y de haber empezado a comer nuevamente si le corresponde una dosis ese día.
Humalog, NovoLog, Apidra o insulina regular	Aplíquese la mitad de la dosis habitual por la noche.	No se aplique antes del procedimiento. Vuelva a aplicarse después de haber empezado a comer nuevamente.
NPH o insulina premezclada	Aplíquese la mitad de la dosis habitual por la noche.	Si tiene diabetes tipo 2, no se aplique antes del procedimiento. Retome la aplicación después de haber empezado a comer nuevamente. Si tiene diabetes tipo 1, aplíquese la mitad de la dosis habitual. No se aplique si el azúcar en la sangre es inferior a 120.
Lantus, Levemir, Basaglar, Triseba, Toujeo	Si tiene diabetes tipo 2, aplíquese la mitad de la dosis habitual. Si tiene diabetes tipo 1, aplíquese el 80 % de la dosis habitual.	Si tiene diabetes tipo 2, aplíquese la mitad de la dosis habitual. Si tiene diabetes tipo 1, aplíquese el 80 % de la dosis habitual.
Bomba de insulina	No haga ningún cambio si está en modo automático (la insulina se ajusta según la glucosa detectada). Si está en modo manual, mantenga el mismo nivel de base por la noche o reduzca al 80 % el nivel de	No haga ningún cambio si está en modo automático. Si está en modo manual, mantenga el mismo nivel de base por la noche o reduzca al 80 % el nivel de base por la mañana.

PACIENTES QUE TOMAN MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES

Si toma medicamentos anticoagulantes, como Coumadin, Warfarin, Plavix, Eliquis, Pradaxa, Effient, Jantoven, Pletal o Xarelto, necesitará instrucciones específicas para saber cuándo debe dejar de tomar estos medicamentos. La mayoría de los pacientes debe dejar de tomarlos 3 o más días antes del procedimiento. Un miembro del personal lo llamará para confirmar su cita y repasará con usted sus instrucciones especiales.

INSTRUCCIONES SOBRE LA PREPARACIÓN PARA LOS INTESTINOS CON SUPREP, SUFLAV

Importante: Las instrucciones en la caja de SuPrep pueden ser diferentes de las de este folleto.
Lea y siga las instrucciones que aparecen abajo.

Suprep viene con dos frascos de 6 onzas de solución y un recipiente de 16 onzas para mezclar.

EL DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA

- **Solo líquidos claros hoy. No se permite ninguna comida sólida, productos de leche ni alcohol.**

LA NOCHE ANTES DE LA COLONOSCOPIA

***Empiece a las 5:00 p. m.**

- Vierta una botella de 6 onzas de solución en el recipiente de mezcla.
- Agregue agua fría hasta la línea de 16 onzas en el recipiente y mezcle bien. **No beba Suprep sin agregar agua.**
- Beba toda la solución mezclada en el recipiente.
- Durante la siguiente hora, beba dos recipientes de 16 onzas de agua. Este paso es muy importante. Este líquido permite que la preparación para los intestinos limpie mejor su colon y lo ayude a mantenerse hidratado.

EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA

***Empiece al menos 4 horas antes de la hora de registro.**

- Vierta la segunda botella de 6 onzas de solución en el recipiente para mezclar.
- Agregue agua fría hasta la línea de 16 onzas en el recipiente y mezcle bien.
- **No beba Suprep sin agregar agua.**
- Beba toda la solución mezclada en el recipiente.
- Durante la siguiente hora, beba dos recipientes de 16 onzas de agua. Este paso es muy importante en la preparación para su procedimiento. Este líquido permite que la preparación para los intestinos limpie mejor su colon y lo ayude a mantenerse hidratado.

DOS HORAS ANTES DEL REGISTRO

- Deje de beber todo tipo de líquido claro.

RECORDATORIO

NADA POR LA BOCA 2 HORAS ANTES DEL REGISTRO

De lo contrario, el procedimiento se tendrá
que reprogramar.

PREPARACIÓN PARA LOS INTESTINOS CON Nulytely, GaviLyte-C, PEG-3350 O GoLYTELY

Importante: Las instrucciones que se incluyen con la receta pueden ser diferentes de las de este folleto.
Lea y siga las instrucciones que aparecen abajo.

CÓMO PREPARAR LA SOLUCIÓN DE PREPARACIÓN PARA LOS INTESTINOS

- Llene el recipiente hasta la mitad con agua tibia. El polvo se disuelve mejor en agua tibia que en agua fría.
- Sacuda el recipiente con fuerza para disolver el polvo.
- Agregue suficiente agua fría y llene el recipiente hasta la línea marcada. Sacuda el frasco con fuerza otra vez. El recipiente lleno tiene dieciséis tazas de 8 onzas de solución.
- **No agregue hielo ni saborizantes a la solución.**
- El recipiente debe guardarse lejos de la luz directa o el calor.
- Puede guardar el recipiente en el refrigerador o en hielo hasta que beba toda la preparación.
- Beba toda la solución en un plazo de 24 horas desde que la preparó.

EL DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA

- **Solo líquidos claros hoy. No se permite ninguna comida sólida, productos de leche ni alcohol.**

LA NOCHE ANTES DE LA COLONOSCOPIA

***Empiece a las 5:00 p. m.**

- Agite bien el recipiente con la solución para limpiar los intestinos.
- Beba un vaso de 8 onzas de la solución rápidamente. La solución para limpiar los intestinos no funciona tan bien si usted bebe pequeñas cantidades (sorbos).
- Beba una taza de la solución cada 10 a 15 minutos, hasta terminar las 12 tazas de la preparación. Eso le llevará unas tres horas.
- Deje las 4 tazas restantes de solución para beber el día de la colonoscopia. Puede dejar la preparación en hielo o refrigerarla.

EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA

***Empiece al menos 5 horas antes de la hora de registro.**

- Mezcle la solución agitando enérgicamente el recipiente.
- Beba rápidamente una taza de 8 onzas de la solución de preparación de los intestinos.
- Cada 10 a 15 minutos, beba otra taza de solución de preparación para los intestinos hasta que haya bebido toda la solución o hasta que las deposiciones sean claras y no tengan material sólido.

DOS HORAS ANTES DEL REGISTRO

- Deje de beber todo tipo de líquido claro.

RECORDATORIO

NADA POR LA BOCA 2 HORAS ANTES DEL REGISTRO

De lo contrario, el procedimiento se tendrá que reprogramar.

INSTRUCCIONES SOBRE LA PREPARACIÓN PARA LOS INTESTINOS CON SuTab

Importante: Las instrucciones en la caja de SuTab pueden ser diferentes de las de este folleto.

Lea y siga las instrucciones que aparecen abajo.

SuTab viene con dos frascos de 12 pastillas cada uno y una taza de 16 onzas.

EL DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA

Empiece la dieta de líquidos claros en la mañana.

LA NOCHE ANTES DE LA COLONOSCOPIA

***Empiece a las 5:00 p. m.**

- Agregue agua potable fría hasta la línea de 16 onzas en el recipiente de SuTab.
- Abra 1 frasco de SuTab con 12 pastillas. En un plazo de 15-20 minutos, trague cada pastilla con agua hasta haber tomado las 12 y haber bebido las 16 onzas de agua. **No tome las pastillas sin agua.**
- 1 hora después de haber terminado las 12 pastillas y las 16 onzas de agua, beba lentamente las otras 16 onzas de agua en 30 minutos.
- Unos 30 minutos después de haber terminado las segundas 16 onzas de agua, empiece a beber otras 16 onzas de agua.
- Debe beber toda el agua que se menciona arriba para asegurar una hidratación adecuada y una preparación eficaz.

EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA

***Empiece al menos 6 horas antes de la hora de registro, repitiendo los pasos de arriba.**

DOS HORAS ANTES DEL REGISTRO

- Deje de beber todo tipo de líquido claro.

RECORDATORIO

NADA POR BOCA 2 HORAS ANTES DEL REGISTRO

De lo contrario, el procedimiento se tendrá que reprogramar.

Preguntas frecuentes

¿Por qué me asignaron esa preparación?

La preparación se receta según lo que suele cubrir su seguro. Si quiere otra preparación, avísenos. Puede tener un costo de bolsillo mayor para usted en la farmacia.

¿Qué es una dieta baja en fibras/residuos?

Una dieta baja en residuos reduce la frecuencia y el volumen de las

Comidas permitidas

Pan blanco
Farina
Salsa de manzana
Plátano
Fruta enlatada/cocinada y vegetales cocinados
Margarina o mantequilla
Papas blancas (sin piel)
Huevos
Caldo
Tofu
Arroz blanco
Mantequilla de maní cremosa
Carne de res, aves de corral o pescado bien cocinados

Comidas que debe evitar

Granos integrales (avena, centeno, cebada)
Nueces, semillas, legumbres
Ajo
Brócoli
Maíz
Fruta deshidratada
Alcohol
Chocolate
Carne con cartílago
Sauerkraut
Pepinillos
Bayas
Palomitas de maíz
Ensaladas
Panes multigrano
Kombucha
Leche/Creamer para el café
Té matcha
Jugo de naranja

deposiciones y prolonga el tiempo que tarda la comida en viajar por los intestinos.

¿Qué debo comprar para prepararme para el procedimiento?

Le conviene abastecerse de algunas cosas para tener a la mano cuando se esté preparando. Si tiene estreñimiento, compre MiraLAX también para ayudar con la preparación. Empiece a tomar MiraLAX 5 días antes del procedimiento.

Lista de compras

Será difícil salir de casa o estar lejos de un baño una vez que empiece a beber la preparación para los intestinos. Compre algunos artículos con antelación.

Farmacia

Preparación

Sodas (lima limón, Ginger Ale, bebidas cola)

Líquidos

PeaceHealth Estimates line: 844-212-1049

Página 10 | 13



Endoscopy Center

3377 Riverbend Drive, 2.º piso, Springfield, Oregon 97477
541-222-6200

- Bebidas deportivas (claras, naranjas, verdes o de lima limón)
- Jugo de manzana o uva verde
- Café o té (sin leche ni crema)
- Caldo concentrado o claro

- Artículos de uso personal
- Pajillas
 - Pañuelos de papel suaves
 - Vaselina
 - Paños de limpieza de higiene personal

P: ¿Realmente tengo que levantarme 5 horas antes de registrarme?

R: Sí. Hemos descubierto que hacer una preparación dividida produce la mejor limpieza porque los pacientes están despiertos moviéndose y continúan bebiendo líquidos claros en lugar de beber la preparación e irse a la cama. *Algunos pacientes fueron reprogramados en numerosas ocasiones debido a una mala limpieza.*

P: ¿Será doloroso mi procedimiento?

R: Se le administrarán medicamentos para sedarse y ayudarlo con cualquier dolor que pueda experimentar. Sin embargo, cada persona responde a la medicación de manera diferente y si el procedimiento es demasiado incómodo para usted, el procedimiento será abortado. A continuación, tendremos que reprogramarlo con un nivel más alto de sedación.

P: ¿Qué tipo de sedación utiliza?

R: RN- Fentanilo y Versed. MAC- propofol administrado por un anestesiólogo.

P: ¿Cómo es la recuperación?

R: COLO: es posible que tenga la sensación de hinchazón o gas atrapado por el agua / aire utilizado para inflar el colon.

EGD: es posible que tenga dolor de garganta o voz ronca durante un par de días.

P: ¿Cuánto dura el procedimiento?

R: Puede esperar estar aquí aproximadamente una hora y media o dos horas.

P: ¿Qué es una dieta baja en residuos?

R: Evite cualquier alimento que tarde más en digerirse (frutas y verduras con cáscara o cáscara, verduras crudas, semillas, nueces, maíz) *Consulte la última página del paquete de instrucciones.*

P: ¿Puedo comer normalmente después de mi procedimiento?

R: El médico le dirá cómo proceder con su dieta en función de cómo vaya el procedimiento. Si le tomaron muchas biopsias (o dilatación para la EGD), es probable que le recomiende alimentos blandos

INSTRUCCIONES PARA LLEGAR

Riverbend Medical Center Outpatient Endoscopy Center

RIVERBEND PAVILION

3377 Riverbend Drive – 2 .º piso
Springfield, Oregon 97477
541-222-6200

**El estacionamiento “C” está junto al edificio Pavilion.
El edificio Pavilion no tiene toldo azul.**

**SOLO se puede entrar al edificio Pavilion desde el estacionamiento por la
PLANTA BAJA o por el 3.er PISO**

NIVEL G

Acceso con Skybridge en nivel 3 a
NORTHWEST SPECIALTY CLINICS &
SACRED HEART MEDICAL CENTER

**ENTRE EN EL EDIFICIO PAVILION
POR LAS PUERTAS VERDES.**



NIVEL 3

← Skybridge a
NORTHWEST SPECIALTY CLINICS &
SACRED HEART MEDICAL CENTER

**NO USE LAS PUERTAS AZULES.
NO TOME SKYBRIDGE.**





Endoscopy Center

3377 Riverbend Drive, 2.º piso, Springfield, Oregon 97477
541-222-6200

**Cuando esté dentro del edificio Pavilion, tome el elevador o las escaleras al 2.º piso.
Llame para solicitar indicaciones adicionales al 541-222-6200.**